HIPPOCRATE

L'OFFICINE DU MÉDECIN

LES BELLES LETTRES

PARIS

COLLECTION DES UNIVERSITÉS DE FRANCE
publiée sous le patronage de l'ASSOCIATION GUILLAUME BUDÉ

HIPPOCRATE

TOME VII

3^e partie

L'OFFICINE DU MÉDECIN

TEXTE ÉTABLI, TRADUIT ET COMMENTÉ

PAR

JACQUES JOUANNA

Professeur émérite à Sorbonne Université

Membre de l'Institut

avec la collaboration de

ANARGYROS ANASTASSIOU

et

ANTONIO RICCIARDETTO

Université de Hambourg

Chargé de recherche au CNRS

PARIS

LES BELLES LETTRES

2024

*Conformément aux statuts de l'Association Guillaume Budé,
ce volume a été soumis à l'approbation de la commission
technique, qui a chargé Mmes Alessia Guardasole et Marie-Hélène
Marganne d'en faire la révision et d'en surveiller la correction en
collaboration avec M. Jacques Jouanna.*

*Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation
réservés pour tous les pays.*

© 2024. Société d'édition Les Belles Lettres
95 boulevard Raspail, 75006 Paris
www.lesbelleslettres.com

ISBN : 978-2-251-00660-4
ISSN : 0184-7155

NOTICE

A. PRÉSENTATION DU TRAITÉ ET DE SON AUTEUR

À l'intérieur de la *Collection hippocratique*, le traité intitulé *Officine du médecin* (Κατ' ἰητροεῖον) a pour objet d'exposer ce qui se passe à l'intérieur du cabinet du médecin qui doit opérer un patient dans le cas de blessures, particulièrement de fractures ou de luxations. Pour désigner le cabinet du médecin, on a conservé le mot traditionnel d'« officine », car le cabinet du médecin dans l'Antiquité grecque ne correspond pas exactement à ce que nous entendons actuellement ainsi. La communauté des médecins dans la Grèce antique n'était pas constituée de généralistes et de spécialistes, comme c'était déjà le cas en Égypte ancienne, mais tout médecin devait faire des opérations et avait donc dans son ἰητροεῖον les instruments nécessaires pour les réaliser. Cela ne signifie pas que les ouvrages de médecine ne pouvaient pas être spécialisés. Car dans la *Collection hippocratique*, il y a deux groupes d'ouvrages spécialisés, l'un en gynécologie, l'autre en chirurgie. Le traité de l'*Officine du médecin* appartient au groupe des cinq grands traités chirurgicaux anciens, les quatre autres étant *Fractures*, *Articulations*, *Mochlique* et *Blessures de tête*. Ce qui distingue ce traité des autres, c'est qu'il ne décrit pas les différentes blessures, fractures et articulations suivant les différentes parties du corps, mais présente, sous forme soit de memento soit d'introduction générale, les différents éléments humains ou

matériels qui entrent en jeu dans toute opération d'un blessé avant d'en venir dans une seconde partie à une réflexion générale sur ce qui était considéré comme essentiel dans la thérapeutique, à savoir les bandages.

I. UN PETIT OUVRAGE QUI EUT UN GRAND SUCCÈS

Ce petit ouvrage a eu un grand succès, parce qu'il livrait des indications concrètes et précises sur la triade de ceux qui participent à la scène lors des opérations : le malade, le médecin et les assistants du médecin, ainsi que sur les conditions de la réussite grâce à un éclairage adapté et à une bonne position des instruments dont le médecin doit se servir. C'est dans cette première partie du traité qu'un lecteur moderne trouvera le plus de plaisir. Cependant, c'est dans la seconde partie relative aux bandages, de compréhension beaucoup plus difficile, que les techniciens de la médecine pouvaient trouver sans aucun doute les conseils les plus précieux sur l'art des bandages après blessure, fracture et luxation. La partie de la thérapeutique la plus délicate à leurs yeux, après la remise en place des os fracturés ou luxés, était de savoir poser correctement un bandage qui ne soit ni trop serré, ni trop lâche, cela d'abord pour l'utilité du malade, mais aussi pour la réputation du médecin.

L'intérêt suscité par cet ouvrage, à la fois séduisant par son art de décrire dans la première partie et surprenant par sa technicité dans la seconde, explique qu'il ait retenu l'attention des glossateurs et commentateurs dès l'époque hellénistique. Le témoignage direct le plus ancien sur l'existence du traité et son attribution à Hippocrate est le glossateur Érotien (1^{er} siècle après J.-C.). Il cite le traité dans la liste des traités authentiques qu'il présente dans le préambule à son *Glossaire*¹, et il a expliqué vingt-

1. Pour le texte critique de ce tableau avec une traduction française, voir J. Jouanna, *Hippocrate. Introduction générale*, CUF

cinq mots du traité dans le corps même du *Glossaire*². Ce témoignage direct donne aussi indirectement des références à des commentaires antérieurs : le plus ancien est celui de Bacchéios de Tanagra (III^e s. avant J.-C.), mentionné plusieurs fois par Érotien dans ses gloses (n^{os} 3, 4, 19, 24) ; vient ensuite celui d'Asclépiade de Bithynie (II^e/I^{er} s.) dont Érotien cite une phrase dans sa glose n^o 8 ; et enfin Épiclès de Crète (I^{er} s. avant J.-C.), cité deux fois dans ses gloses (n^{os} 4 et 19). Le deuxième témoignage direct, celui de Galien, tout en étant postérieur d'un siècle à Érotien, est plus important, car, en plus d'un glossaire correspondant à celui d'Érotien, il comporte un long commentaire en trois livres sur l'ensemble du traité qui est transmis dans sa totalité, à la différence de celui des *Fractures* dont la fin a été perdue. Et alors que les lemmes, c'est-à-dire les mots d'Hippocrate, n'avaient été recopiés que partiellement dans le traité des *Fractures*, probablement à cause de la longueur du traité, ils sont régulièrement présents dans *Officine du médecin*, traité plus court, à une exception près. Et de même que le *Glossaire* d'Érotien comportait des renseignements indirects sur des documents perdus relatifs à *Officine du médecin*, l'œuvre de Galien offre la possibilité d'allonger une telle liste. Déjà dans son *Glossaire*, qui est antérieur au Commentaire, il a mentionné une variante que Dioscoride a introduite dans une phrase d'*Officine du médecin* (glose n^o 5). Il s'agit très vraisemblablement de Dioscoride, l'un des deux éditeurs de la *Collection hippocratique* du début du II^e siècle après J.-C. Dans son commentaire à l'*Officine du médecin* (Kühn XVIII/B, 631, 7-9), Galien cite en même

I 1, Paris, Les Belles Lettres, 2020, p. XCII-XCV. L'*Officine du médecin* est cité dans la classe des traités thérapeutiques qui concernent la chirurgie (p. XCIV, l. 5-8) : « Les traités thérapeutiques : parmi eux ceux qui concernent la chirurgie, *Fractures*, *Articulations*, *Plaies*, *Blessures et traits*, *Blessures de tête*, *Officine du médecin*, *Mochlique*, *Hémorroïdes et Fistules*. »

2. Voir la liste dans Notice II, *infra* p. LXVIII-LXXVIII.

temps ces deux éditeurs, Dioscoride et Artémidore Capiton, pour leur reprocher d'avoir introduit des innovations à la place d'anciennes leçons. D'autres noms de médecins ayant cité le texte d'*Officine du médecin* apparaissent dans le commentaire de Galien : Asclépiade de Bithynie (II^e/I^{er} s. avant J.-C.) et Héraclide de Tarente (I^{er} s. avant J.-C.)³. Il est un autre nom propre, celui du philosophe stoïcien Sémios ou Sémias, qui est traditionnellement lu dans le préambule du commentaire de Galien à l'*Officine du médecin* (Kühn XVIII/B 654, 13) et répertorié dans l'histoire de la philosophie stoïcienne. Mais c'est un philosophe fantôme créé à partir d'une mauvaise lecture du texte⁴. Les indications indirectes de Galien sur les anciens commentateurs du traité dans son commentaire se présentent aussi sous une autre forme plus révélatrice sur leur nombre : quand Galien parle des anciennes leçons qui ne sont pas respectées par les modernes, il prend comme point de repère non seulement les manuscrits les plus anciens mais aussi les anciens commentateurs dont il ne donne pas les noms, mais qu'il regroupe en plusieurs catégories selon les variantes ou les interprétations qu'ils proposent. Ces passages sont relativement nombreux et peuvent se repérer assez facilement grâce à Littré qui les a relevés dans de longues notes de son édition. Enfin, après Galien, Oribase (IV^e s. après J.-C.) a été un lecteur attentif d'*Officine du médecin* notamment pour la seconde partie du traité consacrée aux bandages. Et pour compléter l'histoire de la lecture du traité, on signalera que l'une de ses maximes sur les bienfaits de l'activité pour la santé et les

3. Pour le détail de ces deux citations d'Asclépiade de Bithynie et d'Héraclide de Tarente, voir comm. à 4, 3 sq.-10.

4. Voir comm. à c. 1, p. 1, 3-5, et de façon plus détaillée J. Jouanna, « Un philosophe stoïcien fantôme (Συμίου Στωϊκοῦ) et un petit trésor de la langue grecque sur la faculté de concevoir (γνώμη) », *Journal des Savants*, 2022, p. 151-166 = J. Jouanna, *Médecine et tragédie en Grèce antique. Scripta minora (1961-2023)*, éd. par A. Ricciardetto, Paris, Les Belles Lettres, 2024, p. 2799-2809.

méfais de l'inactivité (13, 19) a été citée non seulement par les auteurs médicaux grecs ou latins, comme Celse (1^{er} siècle après J.-C.), mais aussi par les philosophes, et cela jusqu'à l'époque byzantine. En bref, de la période hellénistique, au III^e siècle avant J.-C., jusqu'au X^e siècle après J.-C., le traité de l'*Officine du médecin* que l'on attribuait à Hippocrate a suscité un intérêt non seulement dans le milieu médical, mais plus largement aussi dans le milieu philosophique, Galien étant le principal vecteur de sa célébrité.

II. UN OUVRAGE DONT L'ORGANISATION LATENTE MÉRITE LA PLUS GRANDE ATTENTION

La structure du traité semble être évidente si on le divise en deux parties : l'une sur ce qui relève de l'opération proprement dite (c. 1-c. 6) et l'autre sur le bandage après la remise en place des parties fracturées ou luxées (c. 7-c. 25). Mais il serait illusoire de se fier à la division traditionnelle en chapitres pour dégager l'organisation interne des développements à l'intérieur de chacune des deux parties. Il est vrai que la succession des développements n'est ni annoncée ni conclue de façon claire, comme c'est le cas dans les traités épидictiques comme l'*Art* ou les *Vents*. Il n'y a pas non plus la présence de l'auteur à la première personne du singulier, comme c'est le cas dans les traités épидictiques et même dans les traités chirurgicaux des *Fractures* ou des *Articulations* où l'auteur parle de lui-même⁵. La personne du médecin n'apparaît ici à aucun moment derrière son enseignement. Le seul emploi de la première personne au pluriel est au datif ἡμῶν ayant l'extension la plus large, c'est-à-dire nous, les humains. C'est à propos de la distinction entre deux catégories de lumières, la lumière commune (κοινόν), c'est-à-dire la lumière solaire, qui ne dépend pas de nous (c. 1, 1,

5. Sur la première personne dans *Fractures*, voir éd. Jouanna/Anastassiou/Roselli, 2022, p. LXV-LXIX.

OFFICINE DU MÉDECIN
TEXTE ET TRADUCTION

OFFICINE DU MÉDECIN

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΤ' ΙΗΤΡΕΙΟΝ

ΤΙΤ. ante Ἴπποκράτους add. $\overline{\Lambda\Delta} M^{mg} \overline{\Sigma V}^{mg} ||$ ἰητρεῖον M GalL (PA) :
ἰητρίον BV.

[Kw. 30] I. Ou les ressemblances ou les dissemblances dès le début à partir des plus grandes, des plus faciles, de toutes celles qui sont connaissables complètement de toutes les façons : celles qu'il est possible de voir, de toucher et d'entendre ; celles qu'il est possible de percevoir par la vue, par le toucher, par l'ouïe, par le nez, par la langue et par la faculté de connaître ; celles qu'il est possible de connaître par tous les moyens par lesquels nous connaissons.

II. Voici les données en vue d'un acte chirurgical dans l'officine du médecin : le malade, l'opérateur, les aides, les instruments, l'éclairage, où, comment, combien, par quelles choses, de quelle manière, quand ; le corps, l'équipement, le temps, le mode, le lieu.

III. L'opérateur est ou assis ou debout, à la juste mesure par rapport à lui-même, par rapport à la partie opérée, par rapport à la lumière.

De la lumière, il y a deux catégories : la commune et l'artificielle. Eh bien donc la commune ne dépend pas de nous, tan-

TEST. 1 "H ὁμοια-6 γῶναι] Gal. De plac. Hipp. et Plat. IX, 1, ed. De Lacy, CMG V 4,1,2, p. 542, 21-25 (A/I, Test. II, 2, 291). || 1 "H ὁμοια-ἐξ ἀρχῆς] cf. Gal. De plac. Hipp. et Plat. *ibid.*, p. 558, 1 ἐξ ἀρχῆς ἡ ὁμοια ἢ ἀνόμοια (A/I, Test. II, 2, 291). || 1 ἀπὸ τῶν μεγίστων-3 ἀκούσαι] cf. Aretaeus, ed. Hude CMG II, p. 63, 8 sq. || 3-5 ἀ καὶ ἰδεῖν-αἰσθῆσθαι] Marcellinus, De pulsibus, ed. H. Schöne, I 456, 48-457, 58 (A/I, Test. I, 382). || 7 κατ' ἰητρείον] Gal. Gloss. s.v. K 30 κατ' ἰητρείον, Perilli 216, 15 (A/I, Test. II, 1, 379) = supra, p. LXXIX. || 9 ἄρμενα] cf. Erot. fragm. 37 ἄρμενα, Nachmanson 110, 9-12 et fragm. 61, *ibid.*, 117, 4 (A/I, Test. I, 382) = supra, p. LXVIII-LXIX.

2 πάντη B^{corr} V GalL(PA) : πάντη M || 2 sq. γινωσκομένων M : γινωσκομένων BV GalL(PA) || 3 ἀ-ἔστιν om. Ar. || ἔστιν BMV : ἔστι GalL(PA) || 4 ὄψει B^{corr} MV GalL(A) ὄψει uel ὄψει GalL(PA) || καὶ τῇ ἀκοῇ BM GalL(PA) : transp. post τῇ βινὶ V || βινὶ MV GalL(P) : βεινὴ B || 5 γλώσση GalL(PA) Ald. : γλώττη BMV || ἄ, οἷς BMV GalL(P) : ἄ καὶ οἷς GalL(A) οἷς Gal. (Plac.) et ἀ transp. post γινώσκωμεν || 5 sq. γινώσκωμεν Bosquillon : γινώσκωμεν B^{corr} (α delet. B²) GalL(P)

- Kw.30 | I. Ἡ ὁμοία ἢ ἀνόμοια ἐξ ἀρχῆς ἀπὸ τῶν μεγίστων, ἀπὸ τῶν ῥήϊστων, ἀπὸ τῶν πάντη πάντως γινωσκομένων ἄ καὶ ἰδεῖν καὶ θιγεῖν καὶ ἀκοῦσαι ἔστιν ἄ καὶ τῆ ὄψει καὶ τῆ ἀφῆ καὶ τῆ ἀκοῆ καὶ τῆ ῥινὶ καὶ
5 τῆ γλώσση καὶ τῆ γνῶμη ἔστιν αἰσθῆσθαι ἄ, οἷς γινώσκομεν ἅπασιν, ἔστιν γνῶναι. |
II. Τὰ δὲ ἐς χειρουργίην κατ' ἰητρείον· ὁ ἀσθενέων, {274}
ὁ δρῶν, οἱ | ὑπηρεταί, τὰ ὄργανα, τὸ φῶς, ὄκου, ὄκως, {276}
ὄσα, οἷς, ὡς, ὁκότε· τὸ σῶμα, τὰ ἄρμενα, ὁ χρο-
10 νος, ὁ τρόπος, ὁ τόπος. |
III. Ὁ δρῶν ἢ καθήμενος ἢ ἐστεῶς, συμμέτρως πρὸς {278}
ἑωυτόν, πρὸς τὸ χειριζόμενον, πρὸς τὴν αὐγήν.
Αὐγῆς μὲν οὖν δύο εἶδεα, τὸ μὲν κοινόν, τὸ δὲ
τεχνητόν. Τὸ μὲν οὖν κοινὸν οὐκ ἐφ' ἡμῖν, τὸ δὲ

GalT(P) Kühn XVIII/B 660, 17 Gal. (Plac.) γινωσκόμενα M γινγνωσκόμενα BV GalL(A) || 6 ἅπασιν B^{corr} GalT(P) XVIII/B 660, 17 : πᾶσιν MV GalL(PA) || ἔστιν B : ἐστι M GalL(PA) ἔσται V || γνῶναι B^{corr} MV GalL(PA) || 7 δὲ BV GalL(P) : δ' M GalL(A) || χειρουργίην MV : χειρουργείην B χειρουργίαν GalL(PA) || ἰητρείον M GalL(A) : ἰητρίον BV ἰατρείον GalL(P) || 9 ὄσα B² M GalL(A) GalT(P) 669, 15 : ὄσαι B ὀκόσα V GalL(P) || οἷς ὡς M B² ? : εἰσως B οἷσιν ὡς V <οἷς> ὄκως GalT(P) 669, 15 οἷς οἷως GalL(P) ὄκως GalL(A) || ὁκότε τὸ σῶμα B² Ar. GalT(P) Kühn 670, 5 et 7 : ὄκο vel ὄκου / το τε σῶμα B^{ac} (?) ὄκου τό τε σῶμα V GalL(P) ὄκου τὸ σῶμα M ὄκατε τὸ σῶμα (sic) GalL(A) || τὰ ἄρμενα MB² GalL(PA) GalT(P) Kühn XVIII/B 670, 8 : τὰ τε ἄρμενα BV et add. in marg. inf. apud B Βαρχεῖός φησιν τὰ ἐναρμόζοντα· οὐκ ὀρθῶς ἄρμενα γὰρ ἰδίως λέγεται τὰ πρὸς τὴν ἰατρικὴν χριαν (lege χρεῖαν) ἐπιτήδεια ἐργαλῖα (lege ἐργαλεῖα) οἷον σηλῖα (lege σμιλῖα), φλεβοτόμα καὶ τὰ τούτοις ὅμοια B² || 10 ὁ τρόπος, ὁ τόπος M GalL(PA) GalT(P) Kühn XVIII/B, 670, 8 : ὁ τόπος, ὁ τρόπος B ὁ τόπος V || 11 ἐστεῶς BV GalL(PA) : ἐστῶς (sic) M || συμμέτρως BV : ζυμμέτρως M GalL(PA) || 12 τὸ χειριζόμενον BMV GalL(PA) : *his patient* (= τὸν χειριζόμενον) Ar. || 13 αὐγῆς BM : αὐγῆς V GalL(PA) || εἶδεα BMV Corn. : ἴδεια GalL(P) ἴδεια GalL(A) Ald. || 14 τὸ μὲν-2, 1 τεχνητόν om. V || Τὸ μὲν οὖν B GalL(PA) : ἀλλὰ τὸ μὲν M.

dis que [Kw. 31] l'artificielle dépend bien de nous. De chacune d'elles il y a deux usages : ou sous la lumière ou face à la lumière. Sous la lumière est d'un emploi restreint et la juste mesure est évidente. Pour les positions face à la lumière, entre les lumières disponibles, entre les lumières utiles, c'est face à la plus vive qu'il faut tourner la partie opérée, sauf s'il convient qu'elle échappe aux regards ou s'il est honteux de la voir. Dans ces circonstances-là, la partie opérée est à l'opposé de la lumière et l'opérateur à l'opposé de la partie opérée, sans pour autant se faire de l'ombre. De cette façon, en effet, le praticien pourra voir, tandis que la partie opérée ne sera pas vue.

Par rapport à lui-même, si le praticien est en position assise, les pieds sont verticalement en droite ligne des genoux et rapprochés à une petite distance. Les genoux sont un peu plus haut que les aines et à une distance entre eux qui permette d'y poser les coudes et de les placer à côté. Le manteau de façon bien ajustée, bien régulière, équilibrée, analogue sur les coudes, sur les épaules.

Par rapport à la partie opérée, le loin et le proche, le haut et le bas, d'un côté ou de l'autre ou au milieu. Pour le loin et le proche, la limite est que les coudes ne dépassent pas en avant les genoux et en arrière les flancs. Pour le haut, (la limite) c'est ne

TEST. 15 εὐσταλέως] Erot. E 29 εὐσταλέως, Nachmanson 37, 8 et fragm. 62 ibid. 117, 9-11 (A/I, Test. I, 382 sq.) = supra, p. LXIX.

1 δύο αἶ BM : δισσαί V GalL(PA) || χρήσιες BM GalL(PA) : χρήσιες V || 2 ἡ ὑπ' αὐγὴν ἢ πρὸς αὐγὴν BV : ἡ πρὸς αὐγὴν ἢ ὑπ' αὐγὴν M GalL(PA) || 3 χρῆσις MV GalL(P) : eras. B || ante καταφανής add. καὶ GalL(A) || καταφανής τε ἡ μετριότης om. GalL(P) sed habent GalL(A) Ar. || 4 παρρουσέων M GalL(A) : παρρουσῶν BV GalL(P) || ξυμφερουσέων BMV GalL(A) : ξυμφερουσῶν GalL(P) συμφερουσέων Kuehlewein || 5 αὐγέων BM GalL(PA) : αὐγέην V || λαμπροτάτην BV : λαμπρότητα M GalL(PA) || 6 ὀκόσα BMV GalL(A) : ὄσα GalL(P) || prius ἦ om. M || ὀρῆν BMV GalL(PA) : ὀρᾶν Kuehlewein || οὕτω BMV : οὕτωσὶ GalL(PA) || οὕτω-8 sq. ἐπισκοτάζειν om. Ar. || 7 τὸ μὲν αὐγῆ om. V || τὸν δὲ BM GalL(PA) : τὸν μὲν V || 9 οὕτως BMV : οὕτω GalL(A) οὕτω μὲν GalL(P) || ἄν MV GalL(PA) : δεῖ B || ὀρώη edd. : ὀρώη B²V ὀρώη: M ὀρῶν B GalL(PA) || 9 sq. τὸ δὲ χειριζόμενον BMV GalL(PA) : *the person whom he is treating* Ar. (= ὁ δὲ χειριζόμενος) || 10 ὀρῶτο edd. : ὀρω· το B^{ac} ὀρῶτο B² MV GalL(PA) || 11 μὲν BM GalL(PA) Corn. : om. V Ald. || 12 ἔξιν MV GalL(P) : ἤξιν B || εὐθὺ

Kw.31 τεχνητὸν καὶ ἐφ' ἡμῖν. Ὡν ἑκατέρου δύο αἱ χρήσιες, ἢ ὑπ' αὐγῆν ἢ πρὸς αὐγῆν. Ὑπ' αὐγῆν μὲν οὖν ὀλίγη τε ἢ χρήσις καταφανῆς τε ἢ μετριότης. Τὰ δὲ πρὸς αὐγῆν, ἐκ τῶν παρευουσῶν, ἐκ τῶν ξυμφερουσῶν
 5 αὐγέων πρὸς τὴν λαμπροτάτην τρέπειν τὸ χειριζόμενον, πλὴν ὀκόσα ἢ λαθεῖν δεῖ ἢ ὀρήν αἰσχροὺν οὕτω δὲ τὸ μὲν χειριζόμενον ἐναντίον τῇ αὐγῇ, τὸν δὲ χειρίζοντα ἐναντίον τῷ χειριζομένῳ, πλὴν ὥστε μὴ ἐπισκοτάζειν· οὕτως | γὰρ ἂν ὁ μὲν δρῶν ὀρώη, τὸ δὲ {280}
 10 χειριζόμενον οὐχ ὀρώτο.

Πρὸς ἐωυτὸν δέ, καθημένῳ μὲν πόδες ἐς τὴν ἄνω ἴξιν κατ' εὐθὺ γούνασιν· διάστασιν δὲ ὀλίγον συμβεβῶτες· γούνατα δὲ ἀνωτέρω βουδῶνων σμικρόν, διάστασιν δέ, ἀγκῶσιν θέσει καὶ παραθέσει. Ἰμάτιον
 15 εὐσταλέως, εὐκρινέως, ἴσως, ὁμοίως ἀγκῶσιν, ὡμοισιν.

Πρὸς δὲ τὸ χειριζόμενον τοῦ μὲν πρόσω καὶ ἐγγύς καὶ τοῦ ἄνω καὶ τοῦ κάτω, καὶ ἔνθα ἢ ἔνθα ἢ μέσον. Τοῦ μὲν πρόσω καὶ ἐγγύς, ὄριον ἀγκῶνας ἐς μὲν τὸ πρόσθεν γούνατα μὴ ἀμείδειν, ἐς δὲ τοῦπισθεν
 20 πλευράς· τοῦ δὲ ἄνω, μὴ ἀνωτέρω μαζῶν ἄκρας | χείρας {282}

V : ευθυ (sic) B εὐθὺ GalL(P) : ἰθὺ M GalL(A) edd. || γούνασιν B : γούνασι MV GalL(PA) || 12 sq. συμβεβῶτες BM GalL(PA) : ζυμβεβῶτες V || 13 ἀνωτέρω V : ἀνωτέρω M ἀνωτερων (sic) B ἀνωτ^{ov} GalL(P) || βουδῶνων] βουθωνων B || 14 δέ om. GalL(PA) || ἀγκῶσιν B GalL(A) : ἀγκῶσι M ἀγκωσίων V ἀγκῶνων GalL(P) || θέσει MV GalL(PA) : θεσι (sic) B || 14 Ἰμάτιον BM GalL(PA) : Ἰματίων V || 15 εὐσταλέως BMV GalL(PA) : περιεσταλμένως B^{2mg} cf. Test. || εὐκρινέως BMV GalL(PA) : διακεκριμένως B^{2mg} || ὁμοίως om. V || ἀγκῶσιν B GalL(PA) : ἀγκῶσι MV sed transp. ἀγκῶσι post ὡμοισιν V || 16 μὲν BM GalL(PA) : om. V Kuehlewein || post ἐγγύς add. ὄριον V Kuehlewein sed non hab. BM GalL(PA) Ar. || 17 τοῦ ante ἄνω et κάτω BV : om. M GalL(PA) || ante pr. ἔνθα add. ἢ V || 18 ἀγκῶνας V : ἀγκωναις B ἀγκῶνες M GalL(PA) || ἐς M GalL(P) : εἰς V GalL(A) om. B sed add. εἰς B^{2sl} || 19 πρόσθεν BM GalL(PA) : πρόσθεν V || ἀμείδειν BM GalL(P) : ἀμείδησε V || ἐς δὲ BM GalL(P) : εἰς δὲ V GalL(A) || τοῦπισθεν B : τοῦπισθε M τὸ ὀπισθεν V GalL(PA) || 20 ante ἄνω add. τὸ GalL(P) sed non habet GalL(A) || ἀνωτέρω BV GalL(A) : ἀνωτερου M ἀνωτέρ? GalL(P).

pas avoir l'extrémité des membres supérieurs [Kw. 32] plus haut que les seins. Pour le bas, c'est ne pas aller plus bas que la position où, ayant la poitrine sur les genoux, il conserve l'extrémité des membres supérieurs formant un angle droit par rapport aux bras. Pour les positions du milieu, de cette façon (aussi). Pour les positions d'un côté ou de l'autre, c'est (pour le médecin) ne pas quitter son siège, mais en fonction de l'endroit où il doit se tourner, porter le corps et la partie du corps qui agit.

Mais s'il est en position debout, qu'il observe d'abord en étant sur ses deux pieds écartés à égalité, bien ensemble ; mais qu'il opère en étant appuyé sur un seul pied, qui n'est pas celui du côté du membre supérieur qui opère. Pour la hauteur, les genoux sont par rapport aux aines comme dans la position assise. Et pour le reste des limites, qu'elles soient identiques.

Quant à l'opéré, qu'il vienne en aide à l'opérateur par le reste de son corps, en étant soit debout, soit assis, soit couché, afin de conserver de la façon la plus aisée l'attitude convenable, en évitant le glissement, l'affaissement, le retournement, la déclivité, pour que soient sauvegardés l'attitude et l'aspect convenables de la partie opérée, lors de la présentation, lors de l'opération, lors de son maintien dans la suite.

IV. Les ongles ne doivent être ni au-dessus ni en dessous du

TEST. 7-9 [Ἔστεῶτα-χειρα] Gal. In Hp. Fract. comm. Kühn XVIII/B, 427, 12-14 (A/I, Test. II, 1, 381). || 8 ἄλις] Erot. A 68 ἄλις, Nachmanson 20, 5-7 (A/I, Test. I, 383 et n. 1) = supra, p. LXXIX sq. || 10 ἔδρη] Erot. E 30 ἔδρη, Nachmanson 37, 9-17 (A/I, Test. I, 383) = supra, p. LXX. || 14 ἔκστρεψιν] Gal. Gloss. s.v. E 27 ἔκτριψιν A/I, Test. II, 1, 381 et n. 2, ἔκτριψιν Perilli 194, 19 = supra, p. LXXIX ; cf. Gal. Comm. GalT(P) fol. 183, l. 27-29 = Kühn XVIII/B 704, 2-5 ἔκτριψιν uel ἔκστρεψιν uel ἔκτριψιν. || 17 sq. Ὀνυχας-κορυφάς] Gal. De usu partium, c. 7, Helmreich 1, 11, 10 sq. (A/I, Test. II, 2, 293).

1 ἔχειν om. V GalL(P) sed hab. GalL(A) || τοῦ δὲ κάτω μὴ M GalL(PA) : τοῦ κάτω δὲ μὴ V τοῦ δὲ B || κατωτέρω BMV GalL(A) : κατώτερον GalL(P) || ἦ V GalL(PA) : om. BM || ὥστε BM : ὡς τὸ V GalL(PA) || 2 ἔχοντα om. GalL(A) || ἔχειν om. GalL(P) || χειρας ἄκρας BMV : ἄκρας χειρας GalL(PA) [ἄκρας] secl. Kuehlewein || 3 alt. τὰ BMV Corn. : τοῦ GalL(PA) Ald. || δ' B : δὲ MV || 4 τῆς ἔδρης] τὴν καθέδρα B^{2mg} || 5 προσβαλλόμενον B GalL(P) : προσβαλλόμενον MV GalL(A) || σώματος om. B add. B² || 7 δὲ BV GalL(PA) : δεῖ M || ἰδεῖν μὲν BV : -εἰν μὲν GalL(P) δεῖν δὲ M δεῖ GalL(A) || ἀμφοτέρων BM GalL(PA) : ἀμφοτέρω V || 8 δρῶν BMV GalL(PA) : δρῶν Kuehlewein || ἐπιθεβῶτα BM sed add. ἐπιθεβηκωτα B^{2mg} : ἐπι

Kw.32 ἔχειν· τοῦ δὲ κάτω, μὴ κατωτέρω ἢ ὥστε στῆθος ἐπὶ
 γούνασιν ἔχοντα ἔχειν χεῖρας ἄκρας ἐγγωνίους πρὸς
 βραχίονας· τὰ μὲν κατὰ μέσον, οὕτως· τὰ δ' ἔνθα ἢ
 5 πρῶτα, μὴ ἔξω τῆς ἔδρης, κατὰ λόγον δὲ τῆς ἐπιστροφῆς
 προσβαλλόμενον τὸ σῶμα καὶ τοῦ σώματος τὸ ἐργαζό-
 μενον.

Ἐστεῶτα δέ, ἰδεῖν μὲν καὶ ἐπ' ἀμφοτέρων βεβῶτα
 ἐξ ἴσου τῶν ποδῶν ἄλις, δρῆν δὲ τῷ ἐτέρῳ ἐπιθεβαῶτα,
 μὴ τῷ κατὰ τὴν δρῶσαν χεῖρα. Ὑψος· γούνατα πρὸς
 10 βουδῶνας ὡς ἐν ἔδρῃ· καὶ τὰ ἄλλα ὅρια τὰ αὐτά.

Ὁ δὲ χειριζόμενος τῷ χειρίζοντι τῷ ἄλλῳ μέρει
 τοῦ σώματος ὑπηρετεῖτω ἢ ἐστεῶς ἢ καθήμενος ἢ κεί-
 15 μενος ὡς ἂν ῥήϊστα ὃ δεῖ σχῆμα ἔχων διατελέη, φυ-
 λάσσωσιν, | ὑπόστασιν, ἔκστρεψιν, καταντίαν, {284}
 ὡς ὃ δεῖ σῶζῃται καὶ σχῆμα καὶ εἶδος τοῦ χειριζομέ-
 νου, ἐν παρέξει, ἐν χειρισμῷ, ἐν τῇ ἔπειτα ἔξει.

IV. Ὅνουχας μῆτε ὑπερέχειν μῆτε ἐλλείπειν δακτύλων

βεβαῶτα GalL(A) ἐπιβεβῶτα V GalL(P) || 9 τῶ B Corn. : τὸ MV
 GalL(A) Ald. om. GalL(P) ? || γούνατα BM : γόνυ GalL(P) γού-
 νατι GalL(A) γονάτων V || 9 sq. πρὸς βουδῶνας BMV : πρὸς βουδῶνα
 GalL(A) Ald. vulg. προσβεβαῶτα GalL(P) sed lege πρὸς βουδῶνας ;
 cf. Kühn XVIII/B, 700, 11 πληθυντικῶς βουδῶνας || 10 τὰ ἄλλα BV
 GalL(PA) : τάλλα M || 11 sq. τῷ (τῷ ex τοῦ corr. B²) ἄλλῳ μέρει
 τοῦ σώματος BM : τοῦ σώματος τῷ ἄλλῳ μέρει V GalL(P) τῷ ἄλλῳ τοῦ
 σώματος μέρει GalL(A) || 12 τοῦ om. B add. B^{2sl} || ἦ (ante ἐστεῶς)
 BV GalL(PA) : om. M || ἐστεῶς BMV GalL(A) : ἐστῶς GalL(P) ||
 12 sq. κείμενος BMV GalL(A) : κίμενος GalL(P) || 13 ὡς BM : ὄκως
 V ὅς vel ὀσ' GalL(P) om. GalL(A) || ἂν ῥήϊστα B² MV GalL(PA) :
 ἄριστα B || ὃ δεῖ Littre : ὃδ' εἰ B ὃ δὲ M ὃ δὲ εἰς V ὡδε εἰς σχῆμα GalL(P)
 ὡδε ὡς σχῆμα GalL(A) || διατελέη M : διατελέει B GalL(PA) διατελεῖ V
 || 13 sq. φυλάσσωσιν M GalL(PA) : φυλάσσωσιν BV || 14 ὑπόρρουσιν M
 GalL(PA) : ὑπόρρουσιν BV || ἔκστρεψιν I GalT(P) : ἐκστρεψῖν (sic) B
 ἔκτρηψιν V GalL(PA) GalT(P) ἔκτρηψιν I GalT(P) edd. || καταντίαν
 BM GalL(PA) : κατανέαν V καταντίην Bosquillon || 15 ὡς B (sed
 littera una erasa ante ὡς) MV GalL(A) : ἦ ὡς GalL(P) || ὃ δεῖ B
 GalL(PA) : ὀδη M ὃ δι V || σῶζῃται καὶ V : σῶζεται καὶ M GalL(A)
 σῶζεται καὶ B om. GalL(P) || 16 ἐν παρέξει B GalL(PA) : ἐμ παρεξει
 V ἐμπαρέξει M || ἐν τῇ M GalL(PA) : καὶ ἐν τῇ B sed del. καὶ B²
 καὶ τῇ V || ἔπειτα BMV GalL(A) : ἐπιτα GalL(P) || 17 ante Ὅνουχας
 add. Περί ὀνούχων M || post ἐλλείπειν add. τὰς GalL(P) sed non habet
 GalL(A).

sommet [Kw. 33] des doigts. Pour l'usage, exécuter d'un côté avec l'extrémité des doigts, dans la plupart des cas avec l'index face au pouce, de l'autre avec la main entière en pronation, et enfin avec les deux mains opposées. Bonne conformation naturelle des doigts : grand intervalle entre les doigts et opposition entre le pouce et l'index. En revanche, il est une infirmité par laquelle les doigts sont aussi lésés chez les personnes dont le pouce, chez les parents ou lors de la croissance, s'est habitué à se maintenir sous les autres doigts ; c'est évident. Exécuter toutes les tâches en opérant avec chaque main et avec les deux mains en même temps - car elles sont toutes les deux semblables - en visant à le faire correctement, joliment, rapidement, sans peine, aisément, harmonieusement.

V. Pour les instruments, sur le moment et sur la manière (de s'en servir), il en sera exposé (dans la suite). À la place où ils doivent être, qu'ils n'entravent pas l'opération ni ne gênent la possibilité de les prendre, mais qu'ils soient à la portée de la partie du corps qui agit. Et si c'est un autre (que l'opérateur) qui les donne, qu'il se tienne prêt un peu à l'avance, et qu'il agisse quand tu l'ordonnes.

VI. Quant à ceux qui sont auprès du malade, qu'ils présentent la partie opérée afin qu'elle soit livrée (à l'opérateur), et qu'ils maintiennent le reste du corps (du malade) pour qu'il soit immobilisé, tout en restant silencieux et attentifs au donneur d'ordres.

TEST. 2 καταπρηγεῖ] Erot. s.v. καταπρηγεῖ, fragm. 38 (XXXVII) Nachmanson 110, 14-18 (A/I, Test. I, 383) = supra p. LXX sq. || 3-5 Δακτύλων εὐφυῖη-λιχανῶ] Gal. De usu partium I, c. 9, Helmreich 1, 16, 7-9 (= A/I, Test. II 2, 293) ; Ar-Ruhawī, Adab al-Ṭabib 90 a, Levey p. 79 a 30-35 (A/I, Test. III, 326). || 5 νοῦσος-4, 6 εἴθιστα] Asclepiades apud GalT(P), fol. 185^r, l. 5 sq. = Kühn XVIII/B, 715, 12 sq. || 9 ἀγαθῶς] Erot. s.v. A 65 ἀγαθῶς et fragm. 63 Nachmanson (A/I, Test. I, 383) = supra, p. LXXI. || 9 καλῶς] Erot. s.v. K 32 καλῶς et fragm. 64 Nachmanson (A/I, Test. I, 383 sq.) = supra, p. LXXI.

1 κορυφᾶς BMV Gall(PA) Bosquillon Petrequin ; κορυφῆς L Kuehlewein || ἐς BM Gall(A) : εἰς Gall(P) om. V || ἀσκεῖν BV Gall(PA) : ἀσκεῖν M Kuehlewein || δακτύλοισιν BV : δακτύλοισι M Gall(PA) || μὲν BM Gall(PA) : ἐν V || 2 λιχανῶ BV Gall(PA) : λειχανῶ M || μέγαν BMV Gall(A) : μέγα Gall(P) || καταπρηγεῖ BMV Corn. : καταπρινεῖ Gall(A) Ald. καταπρίνησι Gall(P) || 2 sq. ἀμφοτέρησι MV Gall(PA) : αμφοτερας B || 3 ἐναντήσιν M Gall(A) : ἐνανταίς BV Gall(P) || δακτύλων BMV Gal. (De usu partium) : δάκτυλον Gall(PA) Ald. || post δακτύλων add. δ' Gal (De usu partium) Bosquillon || εὐφυῖη Bosquillon Index Hipp. : εὐφυῖα MV Gal. (De usu partium) ευφυεῖαι B ἐκφυῖησι Gall(PA) Ald. || μέγα τὸ MB² Corn. Gal. (De usu partium) : ἔσατο B μέγα τὸν Gall(A) Ald. μετὰ τὸν V μετὰ τῶν Gall(P) || 5 λιχανῶ BV Gall(PA) : λειχανῶ M || νοῦσος-7 δῆλον om. Ar. || τοῖς B τοῖς Gall(PA) Asclepiades apud GalT(P) : τοῖσι δ' M οἷσιν V οἷς Kuehlewein || 5 sq. ἐν γενέτησιν Asclepiades apud GalT(P) : ἐν γενετησιν (sic) B ἐν γενέτησι Gall(P) ἐκ γενεῆς M ἐν γένεσιν V εὐγενετήσι

- Kw.33 κορυφάς· ἐς | χρήσιν ἀσκέειν δακτύλοισιν μὲν ἄκροις τὰ [286]
 πλείστα λιχανῶ πρὸς μέγαν, ὄλη δὲ καταπρηνεῖ, ἀμφο-
 τέρησι δὲ ἐναντίησι. Δακτύλων εὐφυΐη· μέγα τὸ ἐν
 5 μέσῳ τῶν δακτύλων καὶ ἀπεναντίον τὸν μέγαν τῷ
 λιχανῶ· νοῦσος δέ, δι' ἣν καὶ βλάπτονται, τοῖς ἐν γε-
 νέτησιν ἢ ἐν τροφῇ εἶθισται ὁ μέγας ὑπὸ τῶν ἄλλων |
 δακτύλων κατέχεσθαι, δῆλον. Τὰ ἔργα πάντα ἀσκέειν [288]
 ἑκατέρησι δρῶντα καὶ ἀμφοτέρησιν ἅμα — ὅμοιοι γάρ
 εἰσιν ἀμφοτέροι — στοχαζόμενον ἀγαθῶς, καλῶς, τα-
 10 χέως, ἀπόνως, εὐπόρως, εὐρύθμως.
 V. Ὅργανα μὲν καὶ ὅτε καὶ οἷως εἰρήσεται· οὐ
 δεῖ μὴ ἐμποδῶν τῷ ἔργῳ μηδὲ ἐμποδῶν τῇ ἀναιρέσει,
 παρὰ τὸ ἐργαζόμενον δὲ τοῦ σώματος· ἄλλος δὲ ἦν διδῶ,
 ἔτοιμος ὀλίγῳ πρότερον ἔστω, ποιείτω δέ, ὅταν κελεύησ.
 15 VI. Οἱ δὲ περὶ τὸν ἀσθενέοντα τὸ μὲν χειριζόμενον
 παρεχόντων ὡς ἂν δοθῇ, τὸ δὲ ἄλλο σῶμα κατεχόντων
 ὡς ἂν ἀτρεμέη, σιγῶντες, ἀκούοντες τοῦ ἐφε-
 στεῶτος. |

GalL(A) || 6 ἦ om. V ἢ ἐν om. GalL(PA) || τροφῇ BMV Asclepiades
 apud : τροφαῖς GalL(PA) falso M apud Kuehlewein || εἶθισται MV
 GalL(PA) Asclepiades : εἶθισθαι (sic) B || ὑπὸ BV GalL(PA) : ὑπὲρ
 M || 7 δῆλον BMV GalL(PA) : secl. Ermerins Kuehlewein || τὰ ἔργα
 πάντα BM GalL(PA) : τὰ πάντα ἔργα V || ἀσκέειν BMV GalL(PA) :
 ἀσκεῖν Kuehlewein || 8 ἑκατέρησι δρῶντα B Ald. e GalL(A) : ἑκατέρης
 ἰδρῶντα M (< ΕΚΑΤΕΡΗΣΙ ΔΡΩΝΤΑ) ἑκατέρη δρῶντα V GalL(P) ||
 ἅμα] ἅμα GalL(A) || ὅμοιοι BMV GalL(P) : ὅμοιοι Ald. e GalL(A)
 falso M apud Kuehlewein || γάρ om. GalL(P) sed habet GalL(A) ||
 9 ἀμφοτέροι M : ἀμφοτέροι BV ἀμφοτέραις GalL(P) ἀμφοτέρησι Ald.
 e GalL(A) ἀμφοτέραισι falso M apud Kuehlewein || ἀγαθῶς BMV
 GalL(PA) : συμφερόντος (sic) B^{2mg} || καλῶς BMV GalL(PA) : εὐπε-
 πῶς B^{2mg} || 10 εὐπόρως, εὐρύθμως BV : εὐρύθμως, εὐπόρως M Ar.
 GalL(PA) GalT(P) in Kühn XVIII/B, 716, 9 sq. || 11 post μὲν add.
 καὶ οἷα V || οἷως BM GalL(PA) : ὡς V || εἰρήσεται MV GalL(PA) : *we*
have already mentioned these Ar. (= εἰρήται) εἰρήσεται B || ου (sic)
 B οὐ GalL(P) οὐ V lege οὐ : ὅκου M GalL(A) || 12 τῷ ἔργῳ BV : τὸ
 ἔργον M GalL(PA) || μηδὲ vel μὴ δὲ V GalL(PA) : μὴδ' M μὴ (sic)
 B || alt. ἐμποδῶν V GalL(PA) : ἐμποδῶν (sic) B ἐκποδῶν M Kueh-
 lewein || 13 post παρὰ add. δὲ B sed delev. B² || post σώματος add.
 ἔστω Petrequin e Chartier : ἐστι(v) BV Ald. GalL(PA) del. B² om.
 M Littré Kuehlewein || ἄλλος BMV : ἄλλως GalL(PA) Ald. || δὲ B² M
 GalL(PA) : δ' V om. B || διδῶ B² V : διδοῖ BM διδο GalL(PA) ||
 14 ἔτοιμος M : ἐτυμος (sic) B ἔτοιμῶς V GalL(PA) Ald. || κελεύης
 MV GalL(PA) : κελεύει B sed add. ζ B^{2sl} an κελεύη? vide comm. ad
 loc. || 15 τὸ BV GalL(PA) : τὸν M || 16 δοθῇ BM GalL(PA) Foes
 (II, p. 7, n. 9) Bosquillon Petrequin Ermerins : δοκῇ V Ald. Lit-
 tré Kuehlewein || δὲ BM GalL(PA) : δ' V || ἄλλο MV GalL(PA) :
 ἄλλω B || 17 post ὅς add. ὅλον V Petrequin Kuehlewein sed non hab.
 BM GalL(PA) Littré Ermerins || ἀτρεμέη BV GalL(PA) : ἀτρεμῇ M
 ἡρεμῇ B^{2mg} || σιγῶντες MV GalL(PA) : σειγόντες (sic) B σειγόντες
 B² || ἐφεστῶτος BMV : ἐφεστῶτος GalL(PA).